



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

ANEXA

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2015/0156/MRA/ IE/BPA 70241
(pentru un produs biocid)**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 08.12.2016, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare, conform:

Data emiterii Anexei la autorizație: 28.03.2017

Data expirării autorizației: 30.06.2018

ALTE INFORMAȚII, după caz

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezenta anexă este parte integrantă din Certificatul nr. RO/2015/0156/MRA/ IE/BPA 70241

**PREȘEDINTE,
DR. CHIM. GABRIELA GILINCA**



CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID

Nr. RO/2015/0156/MRA/ IE/BPA 70241

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 03.11.2015, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent : IRLANDA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr. IE/BPA 70241 non-profesional

II. Data emiterii autorizatiei: 12 noiembrie 2015

III. Data expirării autorizatiei : 31 martie 2017

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: PROKUM PELET

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: PelGar International Ltd, Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alto Hampshire GU34 2QR, UK, Tel.+44 1420 80744, E-mail: anne@pelgar.co.uk

Pentru distribuire: S.C. PROMEDIVET S.R.L., Str. Lunga 46/G, Sovata, Cod postal 545500, Romania, Tel./Fax: 0040-265570831; E-mail: promedivet@gmail.com

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI (recunoscută reciproc):

PelGar International Ltd, Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alto Hampshire GU34 2QR, UK, Tel.+44 1420 80744, E-mail: anne@pelgar.co.uk

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: PelGar International Ltd, Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alto Hampshire GU34 2QR, UK

NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: PelGar International Ltd, Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, Newman Lane, Alto Hampshire GU34 2QR, UK, Tel.+44 1420 80744, E-mail: anne@pelgar.co.uk



VI.

TIPUL DE PRODUS: Grupa principală: III, Tip de produs: 14

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Pentru utilizatori non-profesionali - in interiorul si exteriorul cladirilor (urbane si agricole)

VIII.

TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida pe suport de cereale maturate si peletate, cu 0,005% brodifacoum ca substanta activa, pentru combaterea soarecilor de casa (*Mus musculus*) si a sobolanilor (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu) – juvenili si adulti, utilizare non-profesionala

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1) Substanta activă

Denumirea comună	<i>Brodifacoum</i>
Denumirea IUPAC	[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substantă activă	0,005%

2) Substanta inactivă/nonactivă –date indisponibile

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Simboluri	-
Fraze de risc (R) și/sau Fraze de pericol (H)	-
Fraze de siguranță (S) și/sau Fraze de prudență (P)	P102- A nu se lăsa la îndemana copiilor. P103 -Cititi eticheta înainte de utilizare. P220- A se păstra / depozita departe de îmbrăcăminte / materiale combustibile. P262- Evitați orice contact cu pielea P270- A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării produsului. P273 -Evitați dispersarea în mediu. P280- Purtați mănuși de protecție. [Utilizatori profesionali]. P301+P310 -IN CAZ DE INGHITIRE: Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA sau un medic. P404- A se depozita într-un recipient închis. P405- A se depozita sub cheie. P501 -Aruncați conținutul/recipientul conform dispozițiilor locale

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Pictograma(e)

-

AMBALAREA**Utilizatori non-profesionali**

Tip/descriere de ambalaj	Material ambalaj	Dimensiuni ambalaj
15,20,25,30,50,sau,60g in pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE in ambalaj de PE/PP(cutii,galeti sau saculete)	<u>Ambalaj interior:</u> pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE <u>Ambalaj exterior:</u> ambalaj de PE/PP(cutii,galeti sau saculete)	250g sau 500g
15,20,25,30,50,sau,60g in pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE in carton captusit cu PE	<u>Ambalaj interior:</u> pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE <u>Ambalaj exterior:</u> carton captusit cu PE	250g sau 500g
15,20,25,30,50,sau,60g in pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE in ambalaj extern din carton presat/carton	<u>Ambalaj interior:</u> pliculete de hartie/PE sauAL/PE sau hartie/AL.PE <u>Ambalaj exterior:</u> carton presat/carton	250g sau 500g
Momeli nepreambalate de pana la 20g(<u>sobolani si soareci</u>) si pana la 60 g (<u>doar sobolani</u>) in tavi cu capac sigilat la cald ambalate in unitati de 2/4/8/12/16/20/24/32 in ambalaj extern din carton presat.	<u>Ambalaj interior:</u> tavi cu capac sigilat la cald <u>Ambalaj exterior:</u> carton.	10g,15g, 20g,25g, 50g, 60g
Momeli nepreambalate de pana la 20g(<u>sobolani si soareci</u>) si pana la 60 g (<u>doar sobolani</u>) in tavi cu capac sigilat la cald, ambalate in statii de intoxicare,inviolabile , de unica folosinta sau folosinta multipla din HDPE sau PP,toate ambalate in unitati de 1,2 sau 4 intr-un ambalaj extern din carton sau cu blistere,sau manson din carton sau punga sigilata la cald,sau	<u>Ambalaj interior:</u> tavi cu capac sigilat la cald <u>Ambalaj exterior:</u> statii de intoxicare din HDPE sau PP in ambalaj extern din carton sau cu blistere,sau manson din carton sau punga sigilata la cald,sau ambalaj extern din plastic sigilat la cald cu invelis protector din carton.	10g,15g, 20g,25g, 50g, 60g



ambalaj extern din plastic
sigilat la cald cu invelis
protector din carton.

PP = polipropilena; PS = polistiren; PE = polietilena, HDPE = polietilena de inalta densitate;
PVC = polivinilcloric

Gramaj momeala: 10g, 15g, 20g, 25g, 30g, 50g si 60g

Maxim al ambalajului produs ,destinat utilizarii non-profesionale este de 500g

Produsele rodenticide vandute non-profesionistilor trebuie sa fie furnizate atat ca statii de intoxicare pre-umplute sau statii de intoxicare ,inviolabile,pre-umplute si pachete de rezerva.Statiile de intoxicare pre-umplute contin o doza letala pentru rozatorul tinta.

Momeala in produsele rezerva destinate non-profesionistilor trebuie furnizate in pachete sau unitati interne (ex. pliculete/impachetate), iar pachetele/unitatile interne vor contine suficienta momeala care sa permita aplicarea corecta pentru un punct de intoxicare,sau mai multe.

Caracteristici specifice legate de siguranta:

În timpul manipulării se va purta mănuși de protecție individuală corespunzătoare.

Este obligatorie spălarea pe mâini după manipularea momelii rodenticide și înainte de a consuma alimente , a bea sau a fuma

XII. POSIBILE EFECTE ADVERSE DIRECTE SAU INDIRECTE

Asupra sănătății umane:

Efecte adverse directe:

Substanța activă Brodifacoum în cantitate suficientă poate produce efecte toxice. Efectele rezultă din inhibarea coagulării sângelui prin interacțiunea substanței active cu vit.K. Simptomele de intoxicație pot include învinețirea cu mai multă ușurință, hemoragii nazale sau gingivale, sînge în scaun sau urină, sîngerare excesivă la nivelul tăieturilor sau abraziunilor minore, și se pot dezvolta pe parcursul a câteva zile.

Efecte adverse indirecte: Efecte iritante principale:

Pe piele: Nu are efecte iritante

La ochi: Nu are efecte iritante

Sensibilizare: Nu are efecte sensibilizante

Asupra sănătății animalelor nevizate :

Identificarea pericolelor


Vertebratale care nu sunt specii țintă pot fi expuse la substanța activă, fie direct prin ingestia de momeală rodenticidă sau a resturilor de momeală (intoxicare primară), fie indirect, prin înghițirea carcaselor de rozătoare care conțin reziduri ale substanței active (intoxicare secundară).

Substanța activă conținută în produs este un antagonist al vitaminei K și inhibă sinteza hepatică a factorilor dependenți de vitamina K.

Antidot: Vitamina K₁ (Eficiența tratamentului trebuie monitorizat prin măsurarea valorilor de laborator ale protrombinei).

Este necesară monitorizarea activității protrombinice imediat după ingestie și în zilele următoare. În caz de activitate protrombinică redusă, se va administra vitamina K.

Efecte adverse directe sau indirecte asupra animalelor:



Cele mai întâlnite semne de otrăvire sunt hemoragiile (hemoragii la nivelul mucoaselor, organelor și parenchimului).

Asupra mediului:

Sol: Trebuie evitată cat mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea pătrunderii în sol, ținând cont de proprietățile PBT ale brodifacumului

Apa: Substanța activă îndeplinește criteriile de PBT: este persistentă în apă, cu tendițe de bioacumulare în organisme și foarte toxică.

Aer: Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării Organisme acvatic; Produsul prezintă un risc acceptabil datorat efectului acut și cronic de categoria I (foarte toxic), a substanței active.

Alte organisme netinta: Produsul nu prezintă risc neacceptabil pt. organismele din mediul terestru
Fără efecte semnificative asupra proceselor de respirație/nitrificare din sol

XIII. ORGANISMELE DĂUNĂTOARE VIZATE

Activitatea	Metoda de testare / Protocolul de testare	Specia	Concentrații	Timpi de acțiune
(1) Evaluarea eficacității Biocide	- Ghidurile OEPP/EPPO (1982) și US EPA (1982) Test de hranire la alegere, cu 20 g / animal / zi momeala imbatranita 2 ani – în condiții de laborator, durata de hranire – 4 zile	<i>Mus musculus</i> (soarelele de casa)	Consum momeala: 43,6%. Consum mediu momeala: 4,1 g / soarece.	Mortalitate 100% după 7-9 zile.
(2) Evaluarea eficacității biocide	- Ghidurile OEPP/EPPO (1982) și US EPA (1982) Test de hranire la alegere, cu 20 g / animal / zi momeala proaspata – în condiții de laborator, durata de hranire - 4 zile	<i>Mus musculus</i> (soarelele de casa)	Consum momeala: 51,7%. Consum mediu momeala: 6,1 g / soarece.	Mortalitate 100% după 6-10 zile.
(3) Evaluarea eficacității biocide	- Ghidurile OEPP/EPPO (1982) și US EPA (1982) Test de hranire la alegere, cu 40 g / animal / zi momeala proaspata – în condiții de laborator, durata de hranire – 4 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenușiu)	Consum momeala: 43,4%. Consum mediu momeala: 30,8 g / sobolan.	Mortalitate 100% după 7-11 zile.
(4) Evaluarea eficacității	- Ghidurile OEPP/EPPO (1982) și US EPA (1982) Test de hranire la	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul)	Consum momeala: 48,2%. Consum mediu	Mortalitate 100% după 7-10 zile.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



biocide	alegere, cu 40 g / animal / zi momeala imbatranita 2 ani – in conditii de laborator, durata de hranire – 4zile	cenusiu)	momeala: 32,8 g / sobolan.	
(5) Evaluarea eficacitatii biocide	- Ghidurile MAFF (1990) si EPPO (1982) Test de hranire in teren (ferma), durata de hranire – 28 zile	<i>Mus musculus</i> (soarecele de casa)	19 statii de intoxicare; 15 g momeala/statie/zi. Consum total: 847g momeala	Eficacitate (calculata conform consumului total de hrana): 96,7%. Eficacitate (stabilita conform numarului maxim de urme): 96%.
(6) Evaluarea eficacitatii biocide	- Ghidurile MAFF (1990) si EPPO (1982) Test de hranire in teren (hol de biserica), durata de hranire – 7 zile	<i>Mus musculus</i> (soarecele de casa)	8 statii de intoxicare; 30 g momeala/statie/zi.	Eficacitate (calculata conform consumului total de hrana): 100%. Eficacitate (stabilita conform numarului maxim de urme): 100%.
(7) Evaluarea eficacitatii biocide	- Ghidurile MAFF (1990) si EPPO (1982) Test de hranire in teren (ferma), durata de hranire – 16 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenusiu)	41 statii de intoxicare; consum maxim: 2248g momeala	Eficacitate (calculata conform consumului total de hrana): 97,8%. Eficacitate (stabilita conform numarului total de urme): 96,7%.
(8) Evaluarea eficacitatii biocide	- Ghidurile MAFF (1990) si EPPO (1982) Test de hranire in teren (ferma), durata de hranire – 13 zile	<i>Rattus norvegicus</i> (sobolanul cenusiu)	14 statii de intoxicare; 100g momeala/zi.	Eficacitate (calculata conform consumului total de hrana): 100%. Eficacitate (stabilita conform numarului maxim de urme): 91,7%.

XIV. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE**1.Conform certificatului de autorizare:**

In interiorul si exteriorul cladirilor (urbane si agricole) – uz non-profesional:

-Pentru combaterea sobolanilor: 10-60 g momeala in statii de intoxicare amplasate la intervale de 10



m (5 m pentru infestare mare) acolo unde sobolanii sunt activi. Se verifica regulat si se inlocuieste momeala consumata pana cand inceteaza consumul. Se repeta tratamentul in cazul unei noi infestari. A nu muta sau deranja statiile de momeala in decurs de cateva zile de la aplicare. Daca nu se semnaleaza nici o activitate, dupa 7-10 zile se muta momeala intr-o zona in care activitatea sobolanilor este mai mare. Daca toate momelile au fost consumate din aria respectiva se creste cantitatea prin cresterea numarului de puncte de momeala. A nu se creste cantitatea de momeala intr-un punct de momeala. Inlocuiti orice momeala consumata sau distrusa de apa sau alte mudarii.

-Pentru combaterea soarecilor: 5-20 g momeala in statii de intoxicare amplasate la intervale de 5 m (2 m pentru infestare mare) acolo unde soarecii sunt activi. Se verifica regulat si se inlocuieste momeala consumata pana cand inceteaza consumul. Se repeta tratamentul in cazul unei noi infestari. Soarecii sunt foarte iscoditori si este in ajutorul tratamentului sa se mute momelile la 2-3 zile in momentul in care sunt inspectate sau inlocuite. Inspectiile trebuie sa fie frecvente in primele 10-14 zile si inlocuite in cazul in care sunt consumate sau distruse de apa sau murdarite. Daca toate momelile au fost mancate sa se creasca cantitatea de momela prin plasarea mai multor puncte de momeala. A nu se creste cantitatea de momeala intr-un punct de momeala. Inlocuiti orice momeala consumata sau distrusa de apa sau alte mudarii.

XV. INSTRUCIUNI DE PRIM AJUTOR

Indicatii generale: În caz de accident, expunere suspectată sau dacă vă simțiți rău, cereți imediat sfatul medicului, și arătați recipientul și eticheta.

Măsuri de prim ajutor:

În caz de inhalare: Nu se aplică. Este puțin probabil riscul de inhalare, în afară de cazul în care praful este prezent. Pacientul trebuie transportat la aer liber și cereți sfatul medicului.

În caz de ingestie: Nu induceți voma. Spălați gura cu multă apă. Cereți imediat sfatul medicului, și arătați recipientul și eticheta.

În caz de contact cu ochii: În general acest produs nu irită ochii, dar poate cauza iritație la persoanele sensibile. Îndepărtați lentilele de contact dacă purtați, spălați ochii 15-20 min. cu apă curgătoare, ținând pleoapele complet deschise. Cereți imediat sfatul medicului.

În caz de contact cu pielea: În general acest produs nu irită pielea, dar poate cauza iritație la persoanele sensibile. Spălați pielea contaminată cu săpun și multă apă. Dacă iritația persistă, cereți sfatul medicului. Îndepărtați și spălați hainele contaminate, și uscați înainte de refolosire.

Informații pentru medic: Brodifacoum este un anticoagulant indirect, antagonist competitiv al vitaminei K, reduce sinteza hepatică ai factorilor de coagulare dependente de vitamina K, producând sângerare. Începutul sângerării poate apărea la câteva zile după expunere.

Tratament: Dacă nu există sângerare activă, timpul de protrombină (INR) trebuie determinat la prezentare, la cel puțin 18 ore de la ingestie și la 48-72 ore după expunere. Dacă INR-ul este mai mare de 4, administrați vitamina K1, 5-10 mg prin injectare intravenoasă lentă (100μg/kg greutate corporală pentru un copil), până când timpul de protrombină se normalizează. Tratamentul cu phytomenadione (oral sau intravenos) poate fi necesară câteva săptămâni. Continuați determinarea timpului de protrombină timp de două săptămâni de la renunțarea la antidot și reluați tratamentul dacă în acest timp se produce o creștere a acestuia. Pentru sfaturi suplimentare, în special în cazul sângerării active, contactați cel mai apropiat serviciu de informare toxicologică sau contactați Biroul



RSI și Informare Toxicologică, tel. 021.318.36.06

Informații pentru orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare:

Antidot: vitamina K1 (Phytomenadione) - sub supraveghere medicală.

Contraindicații: tratament cu anticoagulante

XVI. MĂSURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

În sistemul de canalizare se va aplica numai profesional, evitându-se contactul produsului cu animalele neîntâ, sau pierderile necontrolate.

Măsuri în caz de dispersie accidentală.

Pe baza informațiilor disponibile nu este de așteptat ca produsul să inducă efecte adverse în mediu când este utilizat conform instrucțiunilor. Cu toate acestea trebuie evitată cât mai mult expunerea solului la produsul formulat precum și evitarea pătrunderii în sol, ținând cont de imobilitatea în sol a brodifacumului. În cazul pierderilor pe sol acestea se vor colecta. Dacă se constată pierderi majore se vor informa autoritățile.

Nu este de așteptat să rezulte pierderi, acumulări de substanță activă în aer în timpul utilizării.

În cazul deversărilor în apă, se vor colecta în cel mai scurt timp, pierderile de produs. Se curăță zona contaminată prin spălare cu multă apă evitându-se pătrunderea apelor de spălare în canalizare prin colectarea acestora prin absorbție.

Metode de decontaminare

Statiile și punctele de momeala sunt controlate, iar momeala consumată este înlocuită. În timpul amplasării momelii folosiți mănuși de protecție.

În cazul în care rodenticidul poate ajunge pe sol trebuie să se ia măsuri imediate pentru colectarea lui și curățarea zonei.

În utilizarea profesionista, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curatate înainte de eliminare

XVII. MASURI PENTRU PROTECTIA ANIMALELOR SI A HRANEI PENTRU ANIMALE

Cand sunt folosite stații de intoxicare în zone publice acestea vor fi bine fixate pentru a nu fi trase, (mutate de către animalele domestice) și vor fi însoțite obligatoriu de avertizarea (recipientul va fi inscripționat) „A nu se atinge” și a informației privind compoziția produsului precum și riscul ce presupune.

Se vor controla stațiile de intoxicare cât mai des și se vor înlocui momelile consumate în caz de nevoie. Se vor îndepărta zilnic animalele moarte, resturile de momeală (neconsumate) și se vor elimina conform reglementărilor în vigoare. Se va folosi mănuși adecvate în timpul manipulării animalelor moarte. La încheierea tratamentului, se vor elimina recipientele care conțin momeli neconsumate conform reglementărilor în vigoare.

Recipientele (statiile de intoxicare) cu momeala, trebuie să fie poziționate în siguranță (securizat) în vederea minimalizării riscurilor de deschidere și ingerare accidentală de către animale pentru care momeala nu a fost destinată



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

XVIII. INSTRUCIUNI PENTRU ELIMINAREA ÎN SIGURANȚĂ pentru

Produsul biocid: Eliminarea momelilor și a cadavrelor de rozătoare se face prin incinerare, în conformitate cu prevederile Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor, de către operatori autorizați.

Ambalaj: În utilizarea profesionistă, recipientele, chiar dacă sunt complet goale, trebuie curățate înainte de eliminare

XIX. CONDITIILE DE DEPOZITARE : În ambalajul original bine închis, la loc uscat, bine ventilat și răcoros, departe de alimente și de animale domestice. În loc ferit de accesul persoanelor neautorizate. departe de sursele de căldură.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : **24 luni** (dacă a fost păstrat în ambalajul original sigilat, într-un loc uscat și răcoros, ferit de acțiunea directă a razelor solare).

XX. ALTE INFORMATII: Având în vedere efectele adverse potențiale pentru sănătatea umană, se recomandă citirea cu mare atenție a instrucțiunilor de pe etichetă și respectarea lor.

CARACTERIZAREA RISCULUI

Utilizatori non-profesionali:

Expunerea dermală: Fără purtarea mănușilor de protecție este sub AOEL, dar se recomandă utilizarea lor.

Expunere accidentală (copii): prezintă risc semnificativ de intoxicație prin expunere secundară

Prezentă autorizație este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

